

Farnento



1488MTP5



Collection Vassal-Montpellier

Vass2R02s126-130
1488Mtp5

*2 Rps 126-130
Farnento
44p 5 \$10*

*Farnento
4,5 \$10*











DESIGNATION

CLOS 4 PLANCHE 5 RANG 5 souche 10

Vigueur : 2,5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché.

Péduncule : L - (M) - (C)

Millerandage : 6

Date de Véraison : 3-8

Date de Maturité : 31.8.70 X +3

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P. 13

disc. - sph. - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 3
s2 3 avec pépins - apyrène.
s3 3 JUS : inc. - colcré.
s4 3
s5 4

DESIGNATION

CLOS 4 PLANCHE 5 RANG 5 Souche 10

Vigueur : 3,5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Péduncule : L - M - (C)

Millerandage : 9,5

Date de Véraison : 10.8.71

Date de Maturité : 14.9.71 +4

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P. 13

disc. - sph. - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 8
s2 3 avec pépins - apyrène
s3 2
s4 3 JUS : inc. - coloré
s5 6

DESIGNATION

CLOS 4 PLANCHE 5 RANG 5 Souche 10

Vigueur : 3

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Péduncule : L - (M) - (C)

Millerandage : 8 0

Date de Véraison : 8-8-72

Date de Maturité : 5.9.72 X +3

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P. 13x13

disc. - sph. - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 9
s2 8 avec pépins - apyrène
s3 8
s4 8 JUS : inc. - coloré
s5 9

Année : 1970

Emplacement 4-5.5.10 Désignation / Farnento

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		27.3	1-4				
1	3	0	2				
2	3	0	2				
3	f						
4	f						
5	2	1	2				

De 1-4-70 + 5

Année : 1971

Emplacement 4.5.5.10 Désignation Tarnento

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		30/3	2/4				
1	4	1	4				
2	4	1	4				
3	f						
4	f						
5	4	1	3				

De 31-3-71 (+1)

Année :

Emplacement 4.5 \$ 10 Désignation / .. Fermento

		Nombre Total d'yeux	D A T E S				
			44.3	17.3	20.3		
1	4	0	0	2.			
2	4	0	1	2.			
3	4	1	2	3			
4	4	0	0	2.			
5	4	0	2	3			

De 20-3-72x
(+1)

Désignation :

Farnento

Emplacement :

4.5 S104.2

(A) BOURGEOISEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux 9.
42 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune ⑤ - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées ⑦ - en gouttière ⑧^{1e} - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses ⑧ - cotonneuses 9.
44 - blanches ① - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes ⑤ - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Calvo 70

Farnetis

Désignation :

4.5510.2

Emplacement :

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 70

Désignation :

Farmento

Emplacement :

4.5 § 10 2-4

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAIISON

Colonne

- 50 - mérithalle : ^{dist} dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert ⑧.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨.
- 52 - vrille : verte 1 - jaune ② - rouge clair 3
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré ^{dist} ⑦ - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 70

N° ordre

4.5510

Désignation

Farnento

VASSAL

Planche

côté n°

souche 1

(2)

3

4

5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/ limbe : inférieur, à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Calvo 70

Emplacement :

Désignation :

Farnento

4.5 \$104.5

GRAPPE

- 13
- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 12
- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen (4) - court (3).
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Calvo 70

DENOMINATION / *Farmento*
EMPLACEMENT /

4.55104.2

SARMENT DE VIGNE

- Sarment** : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce** : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en lames (2).
- Section transversale** : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface** : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3),
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)
- Villosité** : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds** : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne** : *8-11* cms
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),
autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)
: plus foncé (6), de couleur gris (1), jaune (2),
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux** : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire** : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

N° d'ordre : 1488 05
Désignation : Farnento
Emplacement : 4 55.10

Angle des nervures : 1 - ② - 3
Sexe : 4 - 5 - 6
L₁/L₂ : ⑦ - ⑧ - ⑨
L₂/L : ⑩ - ⑪
Nombre de lobes : 12 - 13 - ⑭ - 15 - 16
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - ⑮ - ⑯ - 20
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - ⑰ - ⑱ - 24
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - ⑳ - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : ②⑥⑥
Sinus pétiolaire ouvert : ②⑥⑦
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - ③② - 33 - 34 - ③⑤ - 36 - ③⑦ - 38 - 39
Fond sinus latéral Sup. en V : ②⑥⑧ - en U : ②⑥⑨ - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert : ②⑦①
Dents : forme : ④① - 41
Dents (angle) : 42 - ④③ - ④④
Angle du lobe terminal : 45 - ④⑥ - ④⑦
Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - ④⑨ - ⑤①
Nb. dents du point pét. à L₃ : 51 - 52 - 53 - ⑤④ - ⑤⑤ - ⑤⑥ - ⑤⑦ - 58 - 59
Angle des nervures L₃ L'₃ : ⑥① - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - ⑥⑤ - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

N° d'ordre :

m

Désignation :

Farmento

Origine :

Emplacement :

du pl 5 8 10

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - 3. 8
9 - L₁/L (1) - (2) - (3).
10 - L₂/L (1) - (2).
11 - Lobes 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - (1) - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - 8.
16 - Dents : ferme (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B 1 - 2 - (3).
18 - Angle lob. term. (1) - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.
21 - Angle L₃ K₄ L₃ (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Domergue 80

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2015
CodeVar : 150 CodeIntro : 150Mtp23
Nom Var : Syrah
Observateur :
Emplacement : Vass2R01s126-130

PHENOLOGIE						
Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	Jaune	Rougeâtre	Rouge	Rouge foncé	rouge violet

VIGUEUR ET CROISSANCE						
Oiv 351	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	absent ou très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

RESISTANCE						
Oiv 459	Degré de résistance <i>Botrytis</i> grappe		très faible ou faible	moyenne		élevée ou très élevée

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	4		31/3	4	
2	4		31/3	3	
3	Faible 2		2/4	0 faible	
4	6	31/3	2/4	6	
5	7	31/3	2/4	13	
Moyenne	21		1 ^{re} /04 +4	26	12

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
	27/5 +3		20/07	24/07 +1	17/08 +1	

22/5 des boutons fls jaunissent et séchent
26/5 des H.F. noy. au feu 24-5

SUIVI DE MATURITE				
Dates	10/8	17/08		
IR	17°	20-21. 17-1		
Valeur papier PH				

Remarque : Gcide (10/08)

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2014 Observateur : B. Genna
Code cépage : Syrah N Code introduction : 23
Nom introduction : Emplacement : 2 RA 5126.130

PHENOLOGIE						
Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	moyenne	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	moyenne	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	moyenne	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	moyenne	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	jaune	rougeâtre	rouge	rouge foncé	rouge violet
VIGUEUR ET CROISSANCE						
Oiv 351	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	faible	moyenne	forte	très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	absent ou très faible.	faible	moyenne	forte	très forte
RESISTANCE						
Oiv 459	Degré de résistance <i>Botrytis</i> grappe		très faible ou faible	moyenne		élevée ou très élevée

Souche	Nombre de bourgeons	Date de débourrement		Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
		début	moitié (oiv 301)		
1					
2					
3					
4					
5					
Moyenne		20/03	25/03 +8		

Date floraison		Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de véraison		Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
début	moitié (oiv 302)		début	moitié (oiv 303)		
20/05	23/05 +2		21/07	26/07 +1	06/09/14 +1	

SUIVI DE MATURETE									
Dates	11/08	18/08	25/08	28/08	01/09	05/09			
IR	15°8	18°5	19°4	21°4	22°	22°3			
Valeur papier PH									

Remarque :

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Observateur :

Nom Var : Syrah Motton

Emplacement : Vass2R01s126-130

PHÉNOLOGIE						
Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aouîtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	Jaune	Rougeâtre	Rouge	Rouge foncé	rouge violet

VIGUEUR ET CROISSANCE						
Oiv 351	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	absent ou très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

RESISTANCE						
Oiv 459	Degré de résistance <i>Botrytis</i> grappe		très faible ou faible	moyenne		élevée ou très élevée

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153) 6/05	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	9	24/3 30/3 25/3	29/3 30/3 30/3 27/3	5	
2	5	21/3 2/4 25/3 24/4 29/4 27/3	29/3	1	
3	2 Rejetée en formation	19/3 27/3	29/3	0	
4	8	25/3 30/3 27/3	29/3	4	
5	10	22/3 19/3 21/3 4/4 25/3 27/3 27/3	27/3	15	
Moyenne	36		29/3 +5	25	7

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
03/06	06.06 +1		31/07	06/08 +2	12.09	

Dates	30.05	02.09	06.03	12.09
IR	21	215	22,5	22,75
Valeur papier PH	encore auide			

I.N.R.A. – Domaine de Vassal – version OIV 2007 – Format 2011

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2012

Observateur :

Code introduction : 150Mtp23

Emplacement : Vass2R01s126-130

PHENOLOGIE

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	Jaune	Rougeâtr e	Rouge	Rouge foncé	rouge violet

VIGUEUR ET CROISSANCE

VIGUEUR ET CROISSANCE						
Oiv 351	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	Absent ou très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

RESISTANCE

		RÉSISTANCE			
Oiv 459	Degré de résistance <i>Botrytis</i> grappe		très faible ou faible	moyenne	élevée ou très élevée

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153) 4/5	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	12		19/3	9	
2	8		16/3	2	
3	8		19/3	0 faible	Souche non ab- veillé et faible h
4	8		19/3	4	
5	9		22/3	6	
Moyenne	37		19/3 - 9	21	6

— foudre non adulte
— vieille et faible. No la prend
en compte

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
	1/06 ⁺³		24.07	01.08 ⁺¹	06.09	

SUIVI DE MATURITE

Dates	29.08	29.08	06.09				
IR	18.8.20 A bis	Aide	OK B17 pied/A				
Valeur papier PH			29.				

Remarque : RAS 18-07

20.07 passé 2 filets

31 07 + 2 filets posés - revoir

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2011

Observateur :

Cépage : Syrah

Code introduction : 150Mtp23

Nom introduction : Syrah Motton

Emplacement : Vass2R01s126-130

PHENOLOGIE

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	Jaune	Rougeâtr e	Rouge	Rouge foncé	rouge violet

VIGUEUR ET CROISSANCE

VIGUEUR ET CROISSANCE						
Oiv 351	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	Absent ou très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

RESISTANCE

RESISTANCE			très faible ou faible	moyenne		élevée ou très élevée
Oiv 459	Degré de résistance <i>Botrytis</i> grappe					

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	6		18/3	4	
2	6		18/3	9	
3	\	\	\	\	
4	6		19/3	9	
5	7		19/3 _{4 déb}	14	
Moyenne	25		19/3 +2	36	14

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
13-05	17-05 ⁺³			22-07 ⁺¹	9-09 ⁺³	

SUIVI DE MATURITE

Dates	18-08-11	25-08.	31-08.				
IR	17,5-16,6 en Lou. A.	17,6-20 17	18,4-17,2 16,2				
Valeur papier PH		en Lou A)	en Lou A. forte.				

Remarque: 21.06.11 RAS Vikiatou + le 30.06 - vers le 06.07
12.07 = 1 mois vers 05 - Quati NV. le 20.07

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Observateur :

Code introduction : 23

Emplacement : **Vass2R01s126-130**

Phénologie

oiv 306 **coloration des feuilles en automne** : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 459 **résistance *Botrytis* grappe** : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal ;

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	8	30/3 24/6	1/4 6/11 8/14	7	
2	6		30/3	7	
3	\	\	\	\	\
4	7		31/3	12	
5	7	29/3 19/6	1/4	7	
Moyenne	28		31/3 + 2	33	12

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
31.05	03.06		26/07	2/08 +2	10/09	

+

Vela'gon
avanced

42

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2010

Code cépage : 0150

Code introduction : 03

Observateur :

150-28

URS 181A

Nom introduction : SYRAH N

Emplacement : Vass10R04s576-580

Phénologie

SR 10 196-130
3 R 10 111 à 165

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 résistance Botrytis grappe : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	\		\	\	\
2	\		\	\	\
3	2		29/3		
4	10		30/3		
5	7		30/3		
Moyenne			30/3 + 1		

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
27/05	01.06			26/07	2/9	

-1

pas vére
le 19/07

+1

+1